

El Morrut de les palmeres



Adult



Palmera sospitosa
Desestructuració de la copa.



Larva al final de l'últim estadi

Cal vigilar les palmeres,
en especial les canàries



Palmera afectada
Desestructuració de la copa, claria-
nes sospitoses, fulles abatudes

Prevenició i lluita



Larves entre la fibra amb
la qual teixiran els capolls

1) Tractaments fitosanitaris preventius

Cal tractar periòdicament (cada 2-3 mesos) les palmeres canàries de les zones afectades mitjançant polvorització gruixuda o a raig a la copa. És fonamental dipositar el producte a la part interna de la base de les fulles, i molt especialment a l'ull.

2) Sanejament de palmeres recuperables

Les palmeres que vulgueu intentar salvar, cal que siguin immediatament sanejades eliminant les parts afectades fins arribar a les parts sanes. Un cop sanejades, cal fer immediatament un tractament fitosanitari (insecticida i fungicida), i posteriorment tractaments periòdicament.

3) Eliminació de palmeres mortes

S'han d'eliminar i destruir les parts afectades per la plaga, mitjançant la trituració. Les restes s'han de dipositar en els punts oficialment establerts, els quals els podeu consultar a l'ajuntament o [al web del DAAM](http://www.daaam.cat).

4) Les palmeres que adquireu han d'anar acompanyades de passaport fitosanitari CE

Cal garantir que les palmeres estan lliures de plaga.



Palmeres afectades, amb diferents
graus d'aplanament de la copa



Capoll



Palmeres greument afectades

Les restes de palmeres afectades, cal dipositar-los en punts controlats; consulteu a l'ajuntament o a www.gencat.cat/dar/sanitat-vegetal/

Si detecteu símptomes sospitosos o palmeres afectades, cal comunicar-ho a l'ajuntament o al Servei de Sanitat Vegetal